



20 NOV. 1976 ES
Concedido el Registro de acuerdo con los datos que figuran en la presente descripción y según el contenido de la Memoria adjunta.

11	NUMERO	464 057	10	A1
22	FECHA DE PRESENTACION			

PATENTE DE INVENCION

Int. Cl.⁴ C07D 401/12, A61K 31/495

30	PRIORIDADES: (31) NUMERO	32	FECHA	33	PAIS
	P 26 51 574.2		12 Noviembre 1976		Alemania
	P 27 37 630.3		20 agosto 1977		Alemania
			Int. Cl. ³		C07D 401/12, A61K 31/495

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL	52	PATENTE DE LA QUE ES DIVISIONARIA
			C07D; A61K		

54 TITULO DE LA INVENCION
"Procedimiento para la preparación de derivados de aminopropanol"

71 SOLICITANTE (ES)
BOEHRINGER MANNHEIM GMBH.


DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Mannheim-Waldhof (Alemania)

72 INVENTOR (ES)
Dr. rer.nat. Wolfgang Kampe, Dr. rer. nat. Walter-Gunar Friebe, Dr. phil. Fritz Wiedemann, Dr. med.vet. Gisbert Sponer, Dr.med.vet. Wolfgang Bartsch y Prof. Dr. med. Karl Dietmann

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE
Carlos Fernández Candela

El presente invento concierne a un procedimiento para la preparación de derivados de piperidinopropilo de la fórmula general I



5 en que R_1 y R_2 pueden ser iguales o diferentes y significan en cada caso hidrógeno, un grupo alcoholo inferior, un grupo hidroxialcoholo, un grupo alcanoiloxialcoholo inferior o un grupo $-CO-Z$ en donde Z representa un grupo hidroxilo, un grupo alcoholoxi inferior o un grupo $-N \begin{matrix} R_6 \\ R_7 \end{matrix}$, en que R_6 y R_7 pueden ser iguales o diferentes y representan en cada caso hidrógeno, un grupo alcoholo inferior o un grupo hidroxialcoholo;

R_3 significa hidrógeno o un grupo $-O-R_8$, en donde R_8 representa hidrógeno, un grupo alcanoil inferior o un grupo arilo, que eventualmente está sustituido con halógeno, alcoholo inferior, alcoholoxi inferior, alcóxicarbonilo, hidroxilo, alcoholitio, nitrilo, nitro o trifluorometilo;

R_4 y R_5 pueden ser iguales o diferentes y significan en cada caso hidrógeno, halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo benciloxi, un grupo alcoholo inferior, un grupo alcoholoxi inferior, un grupo alcoholitio inferior, un grupo carboxilo, un grupo benciloxicarbonilo o un grupo alcoholoxicarbonilo inferior;

X e Y pueden ser iguales o diferentes y en cada caso

significan un átomo de nitrógeno o un grupo -C= en donde
 R_9 representa hidrógeno, un grupo alcoholo inferior, que -
 eventualmente está sustituido con un grupo -OR_8 , en donde
 R_8 tiene los significados indicados, o un grupo -CO-Z , en
 5 donde Z tiene los significados indicados, sus sales farma-
 cológicamente compatibles para preparados farmacéuticos -
 con un contenido de compuestos de la fórmula I.

Dado que los compuestos de la fórmula I, en el -
 caso en que R_3 no sea hidrógeno, poseen un átomo de carbono
 10 no asimétrico, son además objeto del invento las formas óp-
 ticamente activas y las mezclas racémicas de estos compues-
 tos.

Los compuestos de la fórmula I y sus sales farma-
 cológicamente compatibles poseen, además de una pequeña to-
 15 xicidad, pronunciadas propiedades vasodilatadoras, que se
 exteriorizan en lo esencial en una disminución de la ten-
 sión sanguínea; además de ello se observa una inhibición -
 de β -receptores adrenérgicos.

Como un grupo alcoholo inferior de los sustituo-
 20 yentes R_1 , R_2 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 y R_9 han de entenderse -
 grupos de cadena recta o ramificados con 1 a 6, preferible-
 mente 1 a 4 átomos de carbono, tales como por ejemplo meti-
 lo, etilo, isopropilo, propilo, butilo, isobutilo, butilo
 terciario o n-hexilo. Sin embargo, entran en consideración
 25 preferentemente los grupos metilo y etilo.

Grupos hidroxialcoholo de los sustituyentes R_1 ,
 R_2 , R_6 y R_7 contienen 1 a 4 átomos de carbono, y se prefie-

ren los grupos 2-hidroxietilo e hidroximetilo.

Grupos alcoxi de los sustituyentes R_4 , R_5 , R_6 y Z contienen 1 a 6, preferentemente 1 a 4, átomos de carbono, tales como por ejemplo los grupos metoxi, etoxi, propoxi, butoxi o pentiloxi. Se prefieren sin embargo los grupos metoxi y etoxi.

Como grupo alcóxicarbonilo de los sustituyentes R_4 , R_5 y R_6 entran en consideración especialmente los grupos metoxicarbonilo y etoxicarbonilo.

Grupos alcohilitio de los sustituyentes R_4 , R_5 y R_6 son grupos con 1 a 6, preferiblemente 1 a 4, átomos de carbono. Se prefiere el radical metilmercapto.


Grupos alcanóilo del sustituyente R_6 contiene 1 a 8, preferentemente 1 a 6, átomos de carbono, siendo sus grupos alcohilo de cadena recta ramificados o cíclicos. Se prefieren los radicales acetilo y pivalóilo.

Como un grupo alcanóiloxialcohilo inferior de los sustituyentes R_1 y R_2 han de entenderse radicales con 1 a 6 átomos de carbono, especialmente el radical acetoximetilo.

Grupos aróilo del sustituyente R_6 son preferiblemente los radicales benzoilo y naftoilo, que pueden estar sustituidos preferiblemente con grupos metilo, halógeno y metoxi.


Como halógeno han de entenderse en el sentido del invento, flúor, cloro, bromo y yodo, especialmente flúor, cloro y bromo.

La preparación de los nuevos compuestos de la fórmula general I está caracterizada porque, de manera en sí conocida se hace reaccionar un compuesto de la fórmula II



en la que X, Y, R₁ y R₂ tienen los significados indicados, B representa un radical reactivo, A significa el grupo >CH_2 ó >C=O ó >CH-E en donde E puede ser un grupo $-\text{O-R}_{10}$ o también juntamente con B significa un átomo de oxígeno y R₁₀ representa hidrógeno o un grupo protector G, en donde, en el caso de los indazoles capaces de tautomería, el grupo protector G puede estar situado también junto al segundo átomo de nitrógeno X, con un compuesto de la fórmula III

10



en la que R_4 y R_5 tienen los significados indicados, y
 en el caso de que A signifique el grupo >C=O se -
 reduce a continuación; y a continuación, en el caso de
 5 que R_8 represente un grupo alcanóilo o un grupo aroilo
 eventualmente sustituido, que se esterifica el grupo -
 hidroxilo que representa eventualmente a R_3 , o en el ca-
 so de que R_8 represente hidrógeno, se hidroliza el gru-
 po éster que representa eventualmente a R_3 así como se
 10 separa un grupo protector G eventualmente presente o,
 en el caso de que uno o varios de los grupos R_1 , R_2 y
 R_9 representen un grupo hidroximetilo, se prepara és-
 te a partir de un grupo alcóxicarbonilo por reducción
 o a partir de un grupo alcanóiloximetilo por hidróli-
 15 sis, o se prepara un grupo metilo por reducción a par-
 tir de hidroximetil, aciloximetil o un grupo alcóxicar-
 bonilo; y los compuestos obtenidos se transforman en -

caso deseado en sus sales farmacológicamente compatibles.

Radicales B reactivos en compuestos de la fórmula II son especialmente radicales de ácidos, por ejemplo de hidrácidos halogenados y ácidos sulfónicos.

5 Compuestos de la fórmula II, en el caso de que

X e Y representen $\begin{array}{c} -C= \\ | \\ R_g \end{array}$, están descritos en Helv. Chim.

Acta 54, 241^B (1971); y en el caso en que X signifique

un átomo de nitrógeno e Y represente $\begin{array}{c} -C= \\ | \\ R_g \end{array}$ están descri

tos en la solicitud de patente alemana P 26.19 164.0. -

10 Compuestos de la fórmula III son conocidos de la DOS -

25 49 999.

Si estos compuestos no han sido preparados todavía explícitamente, pueden ser preparados de modo análogo según los modos de procedimiento arriba indicados.

15

El procedimiento de acuerdo con el invento se lleva a cabo convenientemente en un disolvente orgánico inerte en las condiciones de reacción, por ejemplo tolueno, dioxano, etilenglicoldimetiléter, etanol, n-butanol o dimetilformamida, eventualmente en presencia de -

un agente fijador de ácidos.

La reducción del grupo $>C=O$, que eventualmente ha de ser llevada a cabo, se efectúa por ejemplo mediante hidruros metálicos complejos, tales como borohidruro de sodio, o mediante hidrogenación catalítica con catalizadores de metales nobles.

La reducción que, eventualmente se ha de llevar a cabo, de los sustituyentes R_1 , R_2 y R_9 en compuestos de la fórmula I se efectúa mediante hidruros metálicos complejos, tales como por ejemplo hidruro de litio y aluminio, o mediante hidrogenación catalítica por medio de catalizadores de metales nobles o níquel Raney.

La hidrólisis de los grupos R_1 , R_2 y R_9 de compuestos de la fórmula I puede efectuarse en medio ácido o básico, de modo en sí conocido.

La esterificación de un grupo hidroxilo que representa a R_3 , puede efectuarse de modo usual por reacción con un halogenuro de ácido o un anhídrido de ácido, eventualmente en presencia de un agente fijador de ácidos, tal como por ejemplo piridina.

Como grupos protectores G entran en consideración grupos alcanoilo inferior, por ejemplo el radical acetilo, grupos aroilo, por ejemplo el radical benzilo, grupos arilmetilo, por ejemplo el radical bencilo, o éteres cíclicos, por ejemplo el radical tetrahi-

dropiraniolo. La separación de los grupos protectores G puede efectuarse de manera conocida, de modo correspondiente a su carácter, por hidrólisis o por hidrogenólisis.

5 Para la transformación de los compuestos de la fórmula I en sus sales farmacológicamente inocuas, - se hacen reaccionar éstos preferiblemente en un disolvente orgánico con un ácido orgánico o inorgánico, por ejemplo ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido -
10 fosfórico, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido cítrico, ácido maleico o ácido benzoico.

Los compuestos de la fórmula I, de acuerdo con el invento pueden resultar en forma de una mezcla racémica. El desdoblamiento del racemato en las formas
15 ópticamente activas se efectúa según métodos en sí conocidos pasando por las sales diastereoisómeras. Como ácidos activos pueden utilizarse predominantemente ácido tartárico, ácido málico, ácido camfórico y ácido camfosulfónico.


20 Para la preparación de medicamentos, el com -

puesto de la fórmula I es mezclado de manera en sí conocida con sustancias excipientes, sustancias aromáticas, saporíferas, y colorantes farmacéuticas apropiadas, y por ejemplo se moldea en forma de tabletas o grageas, o se suspende o disuelve en agua o aceite, por ejemplo aceite de oliva, con adición de sustancias auxiliares adecuadas.

El nuevo compuesto de la fórmula I de acuerdo con el invento y sus sales pueden ser administrados por vía enteral o parenteral en forma líquida o sólida. Como medio para inyección entra en consideración preferiblemente agua, que contiene los aditivos usuales para soluciones para inyección, tales como agentes estabilizadores, inductores de disolución o tampones. Tales aditivos son, por ejemplo, tampón de tartrato y citrato, etanol, formadores de complejos (tales como ácido etilendiaminotetraacético y sus sales no tóxicas), polímeros de alto peso molecular (tales como poli(óxido de etileno) líquido) con el fin de regular la viscosidad. Sustancias excipientes sólidas son, por ejemplo

plo, almidón, lactosa, mannita, metilcelulosa, talco, ácidos silícicos altamente dispersos, ácidos grasos - de elevado peso molecular (tales como ácido esteárico), gelatinas, agar-agar, fosfato de calcio, estearato de magnesio, grasas animales y vegetales, y polímeros sólidos de alto peso molecular (tales como polietilenglicoles); preparados apropiados para administración por vía oral pueden contener en caso deseado sustancias saporíferas y edulcorantes.

10 Se prefieren en el sentido de la presente solicitud, aparte de los compuestos mencionados en los ejemplos, los siguientes:



4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-ter.-
butil-indol

4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-me -
til-bencimidazol

5 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-me -
til-benzotriazol

4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -3-me -
til-indazol

Los siguientes ejemplos muestran algunas de las
10 numerosas variantes de procedimiento que pueden ser utili-
zadas para la síntesis de los compuestos de acuerdo con el
invento. Sin embargo, no deben constituir ninguna limita -
ción del objeto del invento.

EJEMPLO 1

15 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol

La solución de 6,0 g de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-in-
dol y 6,0 g de 4-fenoxi-metil-piperidina en 50 ml de n-bu-
tanol es calentada a ebullición durante 4-6 horas. A conti-
nuación se evapora el disolvente en vacío. El residuo es -
20 recogido en alrededor de 300 a 400 ml de ácido acético 0,5
N y la solución es extraída por agitación con éter. La fase
etérea es desechada y la fase acuosa es alcalinizada con -
solución de carbonato de potasio. El aceite precipitado es
extraído varias veces con éter/acetato de etilo (1:1). Se
25 seca la fase orgánica, se trata con carbón activo y la so-
lución se concentra por evaporación en vacío. El residuo es

disuelto en una mezcla de 60 ml de éter y 25 ml de acetato de etilo y la solución es mezclada con 3,0 g de ácido acético. Se deja cristalizar durante la noche y luego se filtra con succión. Tras recristalizar en isopropanol se obtienen 8,0 g (\approx 57% de la teoría) de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{2}$ -indol en forma de acetato de punto de fusión 127-129°C.

Preparación del benzoato:

7,3 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{2}$ -indol son disueltos en 25 ml de acetato de etilo. A esto se añade una solución de 2,3 g de ácido benzoico en 25 ml de acetato de etilo. El precipitado separado es filtrado con succión y recristalizado en aproximadamente 50 ml de isopropanol. Se obtienen 4,4 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{2}$ -indol como benzoato de punto de fusión 146-147°C.

En el caso de utilizarse 0,94 g de 5-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 0,95 g de 4-fenoximetil-piperidina se obtienen mediante puesta en ebullición a reflujo en 50 ml de butanol, concentración, recogida en acetato de etilo y mezclado con 0,44 ml de ácido acético, 0,56 g de 5-4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{2}$ -indol en forma de acetato (26% de la teoría) de punto de fusión 121-124°C. $[\alpha]_D^{20} = -8,3^{\circ}$ (solución al 1,5 en metanol).

25 EJEMPLO 2

De manera análoga a como se describe en el Ejem-

plo 1 se obtiene

Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
a) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-etoxicarbonil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-etoxicarbonil-indol y 4-fenoximetil-piperidina	95	170 (Isopropanol)
b) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-carbamoil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-carbamoil-indol y 4-fenoximetil-piperidina	59	182 (Acetato de etilo)
c) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-dimetilaminocarbonil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-dimetilaminocarbonilindol y 4-fenoximetil-piperidina	93	178 (Isopropanol)
d) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metoxicarbonil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-6-metoxicarbonil-indol y 4-fenoximetil-piperidina	87	139-140 (Acetato de etilo)
e) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-6-metil-indol y 4-fenoximetil-piperidina	38	122-123 (Acetato de etilo)
f) benzoato de 2-etoxicarbonil-4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metil-indol a partir de 2-etoxicarbonil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-6-metil-indol y 4-fenoximetil-piperidina	44	189 (Isopropanol)
g) benzoato de 4-(2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-cloro-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi)-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(2-clorofenoximetil)-piperidina	21	140-142 (Acetato de etilo)

Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
h) benzoato de 4-<2-hidroxi-3-√4-(3-cloro-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi>-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(3-clorofenoximetil)-piperidina	42	149-151 (Acetato de etilo)
i) benzoato de 4-<2-hidroxi-3-√4-(4-clorofenoximetil)-piperidino 7-propoxi>-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(4-clorofenoximetil)-piperidina	36	156-158 (Acetato de etilo)
j) benzoato de 4-<2-hidroxi-3-√4-(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi>-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(2-metoxifenoximetil)-piperidina	37	115-117 (Acetato de etilo)
k) benzoato de 4-<2-hidroxi-3-√4-(2-metil-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi>-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(2-metilfenoximetil)-piperidina	39	128-129 (Acetato de etilo)
l) benzoato de 4-<2-hidroxi-3-√4-(3-metil-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi>-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(3-metilfenoximetil)-piperidina	39	152-154 (Acetato de etilo)
m) 4-<2-hidroxi-3-√4-(2-metilmercapto-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi>-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(2-metilmercapto-fenoximetil)-piperidina	40	108-110 (Acetato de etilo)
n) 4-<2-hidroxi-3-√4-(4-fluor-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi>-6-metil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-6-metil-indol y 4-(4-fluor-fenoximetil)-piperidina	20	137-139 (Acetato de etilo)

Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
o) benzoato de 4-(2-hidroxi-3-(4-(3-metil-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi)-6-metil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-6-metil-indol y 4-(3-metil-fenoximetil)-piperidina	31	138-140 (Acetato de etilo)
p) 4-(2-hidroxi-3-(4-(2-benciloxi-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi)-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(2-benciloxifenoximetil)-piperidina	90	Aceite
q) 4-(2-hidroxi-3-(4-(4-benciloxi-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi)-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(4-benciloxi-fenoximetil)-piperidina	71	113 (Eter)
r) 4-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi 7-2-pivaloiloximetil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-pivaloiloximetil-indol y 4-(fenoximetil)-piperidina	22	130-132 (Acetato de etilo)
s) 4-(2-hidroxi-3-(4-(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi)-2-metil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-metil-indol y 4-(2-metoxi-fenoximetil)-piperidina	38	137-138 (Acetato de etilo)
t) 4-(2-hidroxi-3-(4-(2-cloro-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi)-2-metil-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-metil-indol y 4-(2-cloro-fenoximetil)-piperidina		
u) 4-(2-hidroxi-3-(4-(2,5-dimetil-fenoximetil)-piperidino 7-propoxi)-indol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-(2,5-dimetil-fenoximetil)-piperidina	44	153-155 (Acetato de etilo)

Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
v) 5- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol a partir de 5-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-fenoximetil-piperidina	59	121-123 (Etanol)
w) 6- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol a partir de 6-(2,3-epoxi-propoxi)-indol y 4-fenoximetil-piperidina	46	144-145 (Etanol)

EJEMPLO 3

4- $\sqrt{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol

Una mezcla de 4,0 g de 4-(3-bromo-propoxi)-indol, 3,4 g de 4-fenoxietilpiperidina, 50 ml de isopropanol y 2,4 g de N-etil-diisopropilamina se calienta durante 6 horas a reflujo, se concentra, el residuo se recoge en cloroformo, y se lava con NaOH diluída y con agua. Después de la concentración de la fase orgánica se recristaliza en acetato de etilo. Se obtienen 2,0 g de 4- $\sqrt{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol (34% de la teoría) de punto de fusión 118-119°C.

EJEMPLO 4

De manera análoga a como se describe en el Ejemplo 3 se obtienen:

Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
a) 5- $\sqrt{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol a partir de 5-(3-cloro-propoxi)-indol y 4-fenoximetil-piperidina	47	107-108 (Acetato de etilo)
b) 6- $\sqrt{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol a partir de 6-(3-cloro-propoxi)-indol y 4-fenoximetilpiperidina	36	123-124 (Isopropanol)

EJEMPLO 5

4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-etoxi-carbonil-indol.

Una mezcla de 0,9 g de 2-etoxicarbonil-4-hidroxi-
 5 indol, 1,7 g de N-(2,3-epoxi-propil)-4-fenoximetil-piperidi-
 na, 1,2 g K_2CO_3 y 50 ml de acetonitrilo se calienta a refluj-
 o durante 10 horas, se filtra en caliente y se deja enfriar
 durante la noche. Se separan por cristalización 0,3 g de 4-
 $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetilpiperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-etoxicar-
 10 bonil-indol (15% de la teoría) de punto de fusión 168-170°C.

EJEMPLO 6

4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-hidro-
 ximetil-indol

A una suspensión de 0,95 g de hidruro de litio y
 15 aluminio en 45 ml de tetrahidrofurano absoluto se añade go-
 ta a gota a 0°C una solución de 4,5 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-
 fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-etoxicarbonil-indol en
 25 ml de tetrahidrofurano absoluto, se agita posteriormen-
 te a la temperatura ambiente durante 1 hora, se descompone,
 20 enfriando, con solución de NaCl, se filtra, se lava poste-
 riormente con tetrahidrofurano y los filtrados reunidos se
 mezclan con 0,01 moles de ácido benzoico. Después de recris-
 talización del benzoato en 25 ml de acetato de etilo se ob-
 tienen 2,5 g de benzoato de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-
 25 piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-hidroximetil-indol (47% de la teo-
 ría) de punto de fusión 145-146°C.

EJEMPLO 7

De manera análoga a como se describe en el Ejemplo

6 se obtienen:

5	Designación	Rendi- miento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
10	a) benzoato de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-hidroximetil-indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metoxi-carbonil-indol	17	153-155 (Acetato de etilo)
15	b) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-hidroximetil-5-metil-indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metoxicarbonil-5-metil-indol		

EJEMPLO 8

20 Acido 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol-2-carboxílico.

A una suspensión de 2,0 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-etoxicarbonil-indol en 50 ml de dioxano se añade una solución de 0,5 g de hidróxido de potasio en 25 ml de agua, se agita durante 16 horas a 50°C, se concentra, se recoge en agua y se ajusta a neutralidad con ácido sulfúrico diluído. Se aislan 1,8 g de ácido 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol-2-carboxílico (96% de la teoría) de punto de fusión 218-220°C (con descomposición).

30 EJEMPLO 9

4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-metil-indol.

Una mezcla de 5,9 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoxi-
 metil-piperidino)-propoxi $\sqrt{2}$ -2-hidroximetil-indol, 114 ml de
 anhídrido de ácido acético y 55 ml de piridina es agitada a
 la temperatura ambiente durante 4 horas y es concentrada en
 vacío. El residuo se recoge en acetato de etilo, se lava
 con agua y se concentra. El compuesto bisacetílico obtenido
 en tal caso (8,0 g) es disuelto en 100 ml de metanol y es
 hidrogenado a una presión de hidrógeno de 1 bar sobre 2,3 g
 de paladio al 10% sobre carbón.

Tras absorberse la cantidad calculada de hidrógeno
 no se filtra, se concentra hasta la mitad de volumen, se
 ajusta a pH 9 con solución 2 N de metanolato sódico, se ca-
 lienta a reflujo durante 10 minutos, se vierte en agua y
 se extrae con cloroformo. Después de la concentración del
 extracto se recoge en acetato de etilo, se agregan 0,01 mo-
 les de ácido benzoico y el benzoato precipitado se recrista-
 liza en 25 ml de isopropanol. Se obtienen 1,6 g de benzoato
 de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{2}$ -2-
 metil-indol (28% de la teoría) de punto de fusión 145-148°C.

EJEMPLO 10

De manera análoga a como se describe en el Ejemplo
 9 se obtienen:

Designación	Rendi- miento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
a) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-pipe- ridino)-propoxi $\sqrt{2}$ -6-metil-indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoxime- til-piperidino)-propoxi $\sqrt{2}$ -6-hidroxi- metil-indol	23	122-123 (Acetato de etilo)

	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
5	b) 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -5,6-dimetil-indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil)-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-hidroximetil-5-metil-indol.		

10 EJEMPLO 11

4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol

Una mezcla de 4,4 g de acetato de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol, 10,2 g de ácido piválico y 2,0 g de anhídrido de ácido piválico es agitada hasta disolución y después de ello es dejada reposar durante 2 días a la temperatura ambiente. Se vierte sobre hielo, se ajusta a pH 9 con agua amoniacal, se extrae con cloruro de metileno, se concentra el extracto y el residuo se tritura con éter. Se aíslan 3,2 g de 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol (69% de la teoría) de punto de fusión 103-105°C.

EJEMPLO 12

De manera análoga a como se describe en el Ejemplo 11 se obtienen:

	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
25	a) 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi- $\sqrt{7}$ -indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi- $\sqrt{7}$ -indol y anhídrido de ácido piválico	66	107 (Eter)

	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
4 10	b) 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metil-indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metil-indol y anhídrido de ácido pivalico	70	81 (Ligroína/éter)
15	c) 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-pivaloiloximetil-indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-hidroximetil-indol y cloruro de pivaloilo	23	76-78 (Heptano-éter)
20	d) 4- $\sqrt{2}$ -benzoiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indol y anhídrido de ácido benzoico	40	108-110 (Eter)
25	e) 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-pivaloiloximetil-indol a partir de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -2-pivaloiloximetil-indol y anhídrido de ácido pivalico	24	93-95 (Heptano-éter)
30	f) 4- $\langle 2$ -pivaloiloxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-metil-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi \rangle -2-metil-indol a partir de 4- $\langle 2$ -hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-metil-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi \rangle -2-metil-indol y anhídrido de ácido pivalico		

EJEMPLO 13

35 4- $\langle 2$ -hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-hidroxi-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi \rangle -indol.

Se hidrogenan 13,8 g de 4- $\langle 2$ -hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-benciloxi-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi \rangle -indol en 250 ml de metanol a la temperatura ambiente y a una presión de hidrógeno de 1 bar so-

bra 3 g de paladio al 5% sobre carbón, se filtra, se concentra y se cristaliza en acetato de etilo. Se obtienen 4,7 g de 4-⟨2-hidroxi-3-⟨4-(2-hidroxi-fenoximetil)-piperidino ⟩-propoxi⟩-indol (42% de la teoría) de punto de fusión 119-121°C.

EJEMPLO 14

De manera análoga a como se describe en el Ejemplo 13 se obtienen:

10	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
15	a) 4-⟨2-hidroxi-3-⟨4-(4-hidroxi-fenoximetil)-piperidino ⟩-propoxi⟩-indol a partir de 4-⟨2-hidroxi-3-⟨4-(4-benciloxi-fenoximetil)-piperidino ⟩-propoxi⟩-indol	39	167 (Isopropanol)
20	b) 4-⟨2-hidroxi-3-⟨4-(2-carboxi-fenoximetil)-piperidino ⟩-propoxi⟩-indol a partir de 4-⟨2-hidroxi-3-⟨4-(2-benciloxicarbonilfenoximetil)-piperidino ⟩-propoxi⟩-indol		

EJEMPLO 15

4-⟨3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi ⟩-bencimidazol

Una mezcla de 7,0 g de triclorhidrato de 2,3-diamino-1-⟨3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi ⟩-benceno y 100 ml de ácido fórmico es calentada a reflujo durante 2 días, es concentrada en vacío y el residuo es recristalizado en etanol. Se obtienen 3,34 g de diclorhidrato de 4-⟨3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi ⟩-bencimidazol (50% de la teoría) de punto de fusión 144-146°C.

El triclorhidrato de 2,3-diamino-1- β -(4-fenoxi
metilpiperidino)-propoxi γ -benceno utilizado como mate-
rial de partida puede ser preparado del siguiente modo:
1-(2-amino-3-nitro-fenoxi)-3-cloro-propano

5 Una mezcla de 21,0 g de 2-amino-3-nitro-fenol, -
20,1 g de carbonato de potasio y 750 ml de butanona es ca-
lentada a reflujo durante 1 hora, es mezclada con 64,0 g
de 1-bromo-3-cloro-propano, es calentada a reflujo duran-
te 3 horas más, filtrada y concentrada. Se aislan 29,0 g
10 de 1-(2-amino-3-nitro-fenoxi)-3-cloro-propano (99% de la
teoría) como sustancia amorfa.

Clorhidrato de 2-amino-3-nitro-1- β -(4-fenoximetil-piperi-
dino)-propoxi γ -benceno.

Una mezcla de 17,5 g de 1-(2-amino-3-nitro-feno-
15 xi)-3-cloropropano, 31,0 g de 4-fenoximetil-piperidina y -
500 ml de etanol es calentada a reflujo durante 7 días. Des-
pués de la concentración se extrae con 500 ml de éter, al
extracto se acidifica con HCl diluido y se concentra por
evaporación. Se obtienen 29,7 g de clorhidrato de 2-amino-
20 3-nitro-1- β -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi γ -benceno
(86% de la teoría) como sal amorfa.

Triclorhidrato de 2,3-diamino-1- β -(4-fenoximetil-piperidi-
no)-propoxi γ -benceno.

Una solución de 28,0 g de clorhidrato de 2-amino-
25 3-nitro-1- β -(4-fenoximetilpiperidino)-propoxi γ -benceno en
600 ml de etanol y 200 ml de agua se hidrogena a la tempera

tura ambiente y a la presión atmosférica sobre 0,4 g de óxi-
do de platino. Después de la filtración se acidifica con
HCl diluido, se concentra y se redissuelve en etanol/ace-
tato de etilo. Se obtienen 21,4 g de triclorhidrato de 2,3-
5 diamino-1- $\sqrt{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -benceno
(70% de la teoría) como sal amorfa.

EJEMPLO 16

De manera análoga a como se describe en el Ejem-
plo 15 se obtienen:

10	Designación	Randi- miento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
15	a) Diclorhidrato de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -bencimidazol a partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -benceno y ácido fórmico	47	123-125 (Etanol)
20	b) Diclorhidrato de 4-(2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi)-bencimidazol a partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1-(2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi)-benceno y ácido fórmico	39	144-145 (Etanol)
25			
30	c) Diclorhidrato de 4-(2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(3-metil-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi)-bencimidazol a partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1-(2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(3-metil-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi)-benceno y ácido fórmico	22	118-120 (Etanol)
35	d) Diclorhidrato de 4-(2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-cloro-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi)-bencimidazol a partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1-(2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-cloro-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi)-benceno y ácido fórmico	39	140-142 (Etanol)

	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
5	e) Diclorhidrato de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoxi-metil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -6-metil-bencimidazol a -		
10	partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoxi metil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -5-metil-benceno y ácido fórmico		

El triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino-propoxi $\sqrt{7}$ -benceno, utilizado como material de partida, puede ser preparado del siguiente modo:

15 Una mezcla de 40,0 g de 1-(2-amino-3-nitro-fenoxi)-2,3-epoxi-propano, 36,2 g de 4-fenoximetil-piperidino y 450 ml de etanol es agitada a la temperatura ambiente - durante 18 horas, y la solución formada en tal caso del 2-amino-1- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -
20 3-nitro-benceno (punto de fusión 117-118°C) es hidrogenada a continuación a la temperatura ambiente sobre 1,0 g de óxido de platino. Después de filtración se acidifica con HCl diluido, se concentra y se redissuelve en etanol/aceta-
25 to de etilo. Se aislan 72,3 g de triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -benceno (81% de la teoría) como sustancia amorfa.

El 1-(2-amino-3-nitro-fenoxi)-2,3-epoxi-propano es conocido.

De modo correspondiente se pueden preparar los
30 restantes productos intermedios mencionados en el Ejemplo 16.

EJEMPLO 17

4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -
bencimidazol.

3,8 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetilpiperidino)-
5 propoxi $\sqrt{7}$ -bencimidazol y 1,3 g de cloruro de pivaloilo son
puestos en ebullición a reflujo durante 2 horas en 25 ml
de piridina. Tras eliminar el disolvente, se recoge el re-
siduo en 100 ml de cloroformo. La solución en cloroformo -
es lavada a fondo con agua, es secada sobre sulfato de so-
10 dio y finalmente mezclada con 50 ml de ácido clorhídrico -
etéreo. Tras la concentración se cristaliza en etanol clo-
hidrato de 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetilpiperidino)-
propoxi $\sqrt{7}$ -bencimidazol de punto de fusión 132-134°C.

EJEMPLO 18

15 De manera análoga a como se describe en el Ejem-
plo 17 se obtiene:

	Designación	Rendi- miento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
20	4-<2-(3,4,5-trimetoxi-benzoiloxi)- 3- $\sqrt{4}$ -(2-cloro-fenoximetil)-piperi- dino $\sqrt{7}$ -propoxi>-bencimidazol a par- tir de 4-<2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-cloro- 25 fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi>- bencimidazol y cloruro de 3,4,5-tri- metoxibenzoílo	32	158-160 (Etanol)

EJEMPLO 19

4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -benzo-
triazol.

A una suspensión de 23,0 g de triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\overline{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\overline{7}$ -benceno en 150 ml de agua y 8,8 ml de ácido clorhídrico concentrado se añade gota a gota a 0°C una solución
 5 de 3,3 g de nitrito de sodio en 37 ml de agua. Después de reposar durante la noche se filtra y el precipitado se recristaliza en metanol. Se aislan 9,5 g de clorhidrato de 4- $\overline{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\overline{7}$ -benzotriazol (47% de la $\overline{7}$ -benzotriazol) de punto de fusión 187-189°C.

10 EJEMPLO 20

De manera análoga a como se describe en el Ejemplo 19 se obtienen:

15	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
a)	Clorhidrato de 4- $\overline{2}$ -hidroxi-3- $\overline{4}$ -(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino $\overline{7}$ -propoxi $\overline{7}$ -benzotriazol a partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\overline{2}$ -hidroxi-3- $\overline{4}$ -(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino $\overline{7}$ -propoxi $\overline{7}$ -benceno y nitrito de sodio	33	161-162
20			
b)	Clorhidrato de 4- $\overline{2}$ -hidroxi-3- $\overline{4}$ -(3-metil-fenoximetil)-piperidino $\overline{7}$ -propoxi $\overline{7}$ -benzotriazol a partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\overline{2}$ -hidroxi-3- $\overline{4}$ -(3-metil-fenoximetil)-piperidino $\overline{7}$ -propoxi $\overline{7}$ -benceno y nitrito de sodio	37	206-208
25			
30c)	Clorhidrato de 4- $\overline{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\overline{7}$ -benzotriazol a partir de triclorhidrato de 2,3-diamino-1- $\overline{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\overline{7}$ -benceno y nitrito de sodio	56	259-260
35			

EJEMPLO 21

4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -benzotriazol.

Una mezcla de 5,1 g de clorhidrato de 4- $\sqrt{2}$ -hi-
 5 droxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -benzotriazol,
 6,7 g de anhídrido de ácido pivalico y 33,3 g de ácido pi-
 válico fundido se agita durante 3 días a la temperatura
 ambiente, se vierte sobre hielo, se neutraliza con agua
 amoniacal y se extrae con cloruro de metileno. Después de
 10 la concentración del extracto se recoge el residuo oleoso
 en metanol y se acidifica débilmente con ácido clorhídrico
 diluido. Al evaporar el disolvente se obtienen 2,53 g de
 clorhidrato de 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidi-
 no)-propoxi $\sqrt{7}$ -benzotriazol (38% de la teoría) de punto de
 15 fusión 131-133°C.

EJEMPLO 22

De manera análoga a como se describe en el Ejem-
 plo 21 se obtienen:

20	Designación	Rendi- miento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
25	a) 4- \langle 2-(4-metil-benzoiloxi)-3- $\sqrt{4}$ -(2- metoxi-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ - propoxi \rangle -benzotriazol a partir de 4- \langle 2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(2-metoxi-feno- ximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi \rangle - benzotriazol y anhídrido de ácido 4-metil-benzoico en dioxano		
30	b) 4- \langle 2-(2-cloro-benzoiloxi)-3- $\sqrt{4}$ - (3-metil-fenoximetil)-piperidino $\sqrt{7}$ - propoxi \rangle -benzotriazol a partir de 4- \langle 2-hidroxi-3- $\sqrt{4}$ -(3-metil-fenoxi- metil)-piperidino $\sqrt{7}$ -propoxi \rangle -ben- zotriazol y anhídrido de ácido 2- 35 clórobenzoico en dioxano		

EJEMPLO 234- $\overline{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\overline{7}$ -indazol

Una mezcla de 5,6 g de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol, 11,2 g de 4-fenoximetil-piperidina y 11 ml de dimetoxietano es calentada a 50°C durante 20 horas, mezclada con 40 ml de éter, filtrada y el precipitado es recristalizado en isopropanol. Se obtienen 4,6 g de 4- $\overline{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\overline{7}$ -indazol (41% de la teoría) de punto de fusión 142-143°C.

Con HCl etéreo se obtiene un clorhidrato de punto de fusión 220-222°C.

EJEMPLO 24

De manera análoga a como se describe en el Ejemplo 23 se obtienen:

	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
15			
20	a) 4-<2-hidroxi-3- $\overline{4}$ -(2-cloro-fenoximetil)-piperidino $\overline{7}$ -propoxi>-indazol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol y 4-(2-cloro-fenoximetil)-piperidina	45	154 (Isopropanol)
25	b) 4-<2-hidroxi-3- $\overline{2}$ -metil-fenoximetil)-piperidino $\overline{7}$ -propoxi>-indazol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol y 4-(2-metil-fenoximetil)-piperidina	38	127-129 (Isopropanol)
30	c) 4-<2-hidroxi-3- $\overline{4}$ -(3-metil-fenoximetil)-piperidino $\overline{7}$ -propoxi>-indazol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol y 4-(3-metil-fenoximetil)-piperidina	46	158-159 (Isopropanol)

	Designación	Rendimiento %	Punto de fusión °C (Disolvente)
5	d) 4-(2-hidroxi-3-(4-(2-metoxi-fenoximetil)-piperidino)-propoxi)-indazol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol y 4-(2-metoxi-fenoximetil)-piperidina	54	151-153 (Isopropanol)
10	e) 4-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi)-5-metil-indazol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-5-metil-indazol y 4-fenoximetil-piperidina	53	156-157 (Isopropanol)
15	f) 4-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi)-6-metil-indazol a partir de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-6-metil-indazol y 4-fenoximetil-piperidina	54	152-153 (Isopropanol)

EJEMPLO 25

20 4-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi)-indazol

En 127 g de 4-fenoximetil-piperidina se incorporan a 80°C 36,8 g de 1-acetil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol, se agita durante 2 horas, se agregan 400 ml de éter y se recristaliza el precipitado en isopropanol. Se obtienen 34,3 g de 4-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi)-indazol (57% de la teoría) de punto de fusión 141-142°C.

EJEMPLO 26

30 Clorhidrato de 3-acetoximetil-4-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi)-indazol

Una mezcla de 4,7 g de 3-acetoximetil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol, 3,8 g de 4-fenoximetil-piperidina y 35 ml de 1,2-dimetoxietano es calentada a 50°C durante 20 horas, es concentrada en vacío, el residuo es recogido en éter y el clorhidrato es precipitado con HCl etanólico. Se obtienen 2,6 g de clorhidrato de 3-acetoximetil-4-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi-7-indazol (30% de la teoría) de punto de fusión 203-204°C (en etanol).

El 3-acetoximetil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol utilizado como sustancia de partida puede ser obtenido del siguiente modo:

2-(2-hidroxi-etil)-3-nitro-fenil-benciléter

se obtiene por reacción de 2-metil-3-nitro-fenil-benciléter con para-formaldehído y butilato terciario de potasio en dimetilformamida como aceite amarillo.

2-(2-hidroxi-etil)-3-amino-fenil-benciléter

se obtiene a partir del compuesto precedente por reducción con hidrato de hidrazina y níquel Raney en metanol como aceite de color verdoso.

2-(2-acetoxi-etil)-3-acetamido-fenil-benciléter

se forma por acetilación del compuesto precedente con anhídrido de ácido acético en tolueno; cristales incoloros, punto de fusión 118-119°C.

1-acetil-3-acetoximetil-4-benciloxi-indazol

se obtiene por nitrosación y subsiguiente cierre de anillo en el tratamiento del compuesto precedente con nitrito de

isoamilo, acetato de sodio y anhídrido de ácido acético en tolueno a 80°C; cristales incoloros; punto de fusión: 99-100°C.

1-acetil-3-acetoximetil-4-hidroxi-indazol

5 se obtiene por hidrogenólisis del compuesto precedente sobre paladio al 10% sobre carbón en tetrahidrofurano; cristales incoloros, punto de fusión 178-179°C.

1-acetil-3-acetoximetil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol

10 se obtiene por reacción del producto precedente con epibromhidrina y carbonato de potasio en dimetilformamida a 60°C; cristales incoloros, punto de fusión: 127-129°C.

3-acetoximetil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol

15 se forma por aminólisis parcial del producto precedente en amoníaco licuado en el espacio de 5 horas, punto de fusión 119-120°C.

EJEMPLO 27

Diclorhidrato de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{3}$ -hidroximetil-indazol

20 Se hace actuar HCl etanólico en exceso sobre 3-acetoximetil-4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{3}$ -indazol, se precipita con éter y se recristaliza en etanol. Con un rendimiento de 48% se aísla diclorhidrato de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{3}$ -hidroximetil-indazol en forma de cristales de color amarillo pálido de punto de fusión 183°C (con descomposición).

25

EJEMPLO 28

4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -7-me
til-indazol

Una mezcla de 4,0 g de 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-
5 bencil-7-metil-indazol, 2,4 g de 4-fenoximetil-piperidina
y 10 ml de 1,2-dimetoxietano es calentada a 60°C durante
20 horas, se concentra, el residuo es recogido en 150 ml
de metanol e hidrogenado sobre 1 g de paladio al 10% sobre
carbón en presencia de 20 ml de HCl concentrado. Después
10 de filtración se concentra, se recoge en lejía de sosa di-
luída, se extrae con cloruro de metileno y se concentra. Se
aislan 3,9 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-
propoxi $\sqrt{7}$ -7-metil-indazol (73% de la teoría) de punto de
fusión: 132-135°C (en isopropanol).

15 El 4-(2,3-epoxi-propoxi)-2-bencil-7-metil-inda-
zol utilizado como sustancia de partida puede obtenerse del
siguiente modo:

2,4-dimetil-3-nitro-fenil-benciléter

se forma en la reacción de 2,4-dimetil-3-nitro-fenol con -
20 cloruro de bencilo en presencia de carbonato de potasio en
dimetilformamida a 80°C; laminillas de color amarillo cla-
ro, punto de fusión 65-67°C.

3-amino-2,4-dimetil-fenil-benciléter

se obtiene por reducción del compuesto precedente con hi-
25 drazina y níquel Raney en metanol, como aceite oscuro.

3-acetamido-2,4-dimetil-fenil-benciléter

se forma en la acetilación del producto precedente con anhídrido de ácido acético en tolueno; cristales incoloros, punto de fusión 160-162°C.

4-benciloxi-7-metil-indazol

5 se obtiene por nitrosación y subsiguiente cierre de anillo del compuesto precedente tras la acción de nitrito de isosamil, acetato de sodio y anhídrido de ácido acético en tolueno a 80-90°C y subsiguiente aminólisis con isopropilamina; agujas, punto de fusión 177-178°C.

10 2-bencil-4-benciloxi-7-metil-indazol

se forma en la reacción del producto precedente con cloruro de bencilo en presencia de carbonato de potasio en dimetilformamida a 80°C en mezcla con el 1-bencil-4-benciloxi-7-metil-indazol isómero (punto de fusión 92-93°C) como -
15 producto principal susceptible de ser separado por cromatografía sobre gel de sílice; cristales incoloros, punto de fusión 87-88°C.

2-bencil-4-hidroxi-7-metil-indazol

se obtiene por hidrogenólisis del compuesto precedente en
20 presencia de paladio sobre carbón; cristales azulados de punto de fusión 201-203°C.

2-bencil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-7-metil-indazol

se obtiene por reacción del compuesto precedente con éster 2,3-epoxi-propílico de ácido para-tolueno-sulfónico en presencia de carbonato de potasio en dimetilformamida a 60-
25 70°C.; cristales incoloros, punto de fusión 85-86°C.

EJEMPLO 294- $\sqrt{3}$ -(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi 7-indazol

4,4 g de 2-bencil-4- $\sqrt{3}$ -(para-toluenosulfoniloxi)-propoxi 7-indazol y 3,8 g de 4-(fenoximetil)-piperidina -
5 son calentados a 60-70°C con agitación durante 15 horas en 20 ml de 1,2-dimetoxietano. La mezcla se diluye con 30 ml de éter, se filtra con succión y el filtrado se concentra en vacío. El tratamiento del residuo filtrado con 40 ml de HCl 2 N conduce a un clorhidrato cristalino. Este -
10 se disuelve en metanol y después de adición de paladio sobre carbón se hidrogena a la presión normal. Tras filtrar con succión el catalizador y concentrar el filtrado en vacío se mezcla con NaOH 2N y se recoge en cloruro de metileno. Se seca con sulfato de sodio, se elimina el disolvente en vacío, se agita el residuo cristalino con ligroína
15 y se recristaliza en metanol; 2,1 g (57,5% de la teoría) de laminillas incoloras; punto de fusión: 160-161°C.

El 2-bencil-4-(3-para-toluenosulfoniloxi-propoxi)-indazol utilizado como material de partida puede obtenerse del siguiente modo:
20

2-bencil-4-hidroxi-indazol

La mezcla de isómeros de 1-bencil-4-nitro-indazol y 2-bencil-4-nitro-indazol, formada por bencilación de 4-nitro-indazol, es reducida con hidrazina y níquel Raney en metanol y a continuación es calentada con hidrógenosulfito sódico en exceso en agua. En tal caso permanece sin disol-
25

ver 1-bencil-4-amino-indazol (punto de fusión 73-75°C). A partir de la solución se separa al acidificar 2-bencil-4-hidroxi-indazol; cristales incoloros, punto de fusión 172-174°C.

5 2-bencil-4-(3-hidroxi-propoxi)-indazol

Se agita una mezcla de 24 g de 2-bencil-4-hidroxi-indazol, 10,4 ml de 3-bromopropanol-(1) y 16 g de carbonato de potasio en 100 ml de dimetilformamida durante 30 horas a 70°C. Después de diluir con cloruro de metileno se filtra con succión, se concentra el filtrado y se purifica el residuo por cromatografía sobre gel de sílice (agente eluyente cloruro de metileno-acetato de etilo 9:1) obteniéndose un aceite.

2-bencil-4-(3-para-toluenosulfoniloxi-propoxi)-indazol

15 En una solución de 7,3 g de 2-bencil-4-(3-hidroxi-propoxi)-indazol, 3,6 ml de trietilamina y 50 ml de tolueno se incorporan 4,9 g de cloruro de ácido para-tolueno-sulfónico, disueltos en 20 ml de tolueno, y se agita durante aproximadamente 100 horas a la temperatura ambiente. Se filtra con succión el clorhidrato de trietilamina formado, el filtrado se concentra cuidadosamente en vacío y el residuo se purifica por cromatografía en columna sobre gel de sílice (agente eluyente cloruro de metileno-acetato de etilo 9:1). Por trituración con éter del aceite -
20 obtenido en primer término se obtienen cristales incoloros,
25 punto de fusión 99-100°C.

EJEMPLO 304-(2-hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi)-6-ter.-butil-indazol

4,2 g de 1-acetil-6-ter.-butil-4-(2,3-epoxipropoxi)-indazol y 11,2 g de 4-(fenoximetil)-piperidina son calentados a reflujo durante 2 horas con 50 ml de 1,2-dimetoxietano. Se concentra y el residuo se purifica por cromatografía sobre gel de sílice (agente eluyente acetato de etilo-etanol 9:1). El aceite obtenido en primer término -
 5 cristaliza después de triturar con éter-ligroína 1:1. Recristalización (por extracción) en éter: 1,8 g (28% de la teoría) de cristales incoloros, punto de fusión 130-131°C.

El 1-acetil-6-ter.-butil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol utilizado como sustancia de partida puede obtenerse del siguiente modo:
 15

2-metil-3-nitro-5-ter.-butil-fenil-benciléter

se obtiene por reacción de 2-metil-3-nitro-5-ter.-butil-fenol con cloruro de bencilo en dimetilformamida en presencia de carbonato de potasio a 80°C; cristales amarillos,
 20 tos, punto de fusión 77-79°C.

2-metil-3-amino-5-ter.-butil-fenil-benciléter

se forma por reducción del compuesto precedente con hidrato de hidrazina y níquel Raney en metanol; aceite de color pardo claro.

25 2-metil-3-acetamido-5-ter.-butil-fenil-benciléter

se prepara por acetilación del compuesto precedente con -

anhídrido de ácido acético en tolueno; cristales incoloros, punto de fusión 170-172°C.

1-acetil-4-benciloxi-6-ter,-butil-indazol

5 se puede preparar por nitrosación y cierre de anillo del compuesto precedente al actuar nitrito de isoamilo, acetato de sodio y anhídrido de ácido acético en tolueno a 80°C; cristales incoloros, punto de fusión 73-74°C.

1-acetil-4-hidroxi-6-ter.-butil-indazol

10 se obtiene por hidrogenólisis del producto precedente en presencia de paladio sobre carbón en metanol; cristales incoloros punto de fusión 182-184°C.

1-acetil-6-ter.-butil-4-(2,3-epoxi-propoxi)-indazol


15 se prepara por reacción del compuesto precedente con epibromhidrina e hidruro de sodio en dimetilformamida a la temperatura ambiente; aceite incoloro.

EJEMPLO 31

4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indazol.


20 Una mezcla de 2,2 g de 4- $\sqrt{2}$ -hidroxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi $\sqrt{7}$ -indazol, 1,25 g de anhídrido de ácido piválico y 10 g de ácido piválico es calentada a 40°C, después de ello es vertida en lejía de sosa 2 N, es extraída con cloruro de metileno, el extracto es concentra
25 do y recristalizado en isoporpanol/agua. Se obtienen 1,3 g

de 4- $\sqrt{2}$ -pivaloiloxi-3-(4-fenoximetil-piperidino)-propoxi 7-indazol (48% de la teoría) en forma de cristales incoloros de punto de fusión 116-188°C.



- REIVINDICACIONES -

1.- Procedimiento para la preparación de derivados de aminopropanol de la fórmula general I




5 en que R_1 y R_2 pueden ser iguales o diferentes y significan en cada caso hidrógeno, un grupo alcoholo inferior, un grupo hidroxialcoholo, un grupo alcanoiloxialcoholo inferior o un grupo $-CO-Z$, en donde Z representa un grupo hidroxilo, un grupo alcoholoxi inferior o un grupo $-N$ $\begin{matrix} R_6 \\ R_7 \end{matrix}$, en

10 que R_6 y R_7 pueden ser iguales o diferentes y en cada caso representan hidrógeno, un grupo alcoholo inferior o un grupo hidroxialcoholo; R_3 significa hidrógeno o un grupo $-O-R_8$ en donde R_8 representa hidrógeno, un grupo alcoholo inferior o un grupo aroilo, que eventualmente está sustituido con halógeno, alcoholo inferior, alcoholoxi inferior,


15 alcoholcarbonilo, hidroxilo, alcoholitio, nitrilo, nitro o trifluorometilo; R_4 y R_5 pueden ser iguales o diferentes y significan en cada caso hidrógeno, halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo benciloxi, un grupo alcoholo inferior, un grupo alcoholoxi inferior, un grupo alcoholitio inferior, un grupo carboxilo, un grupo benciloxicarbonilo o un grupo alcoholoxicarbonilo inferior; X e Y pueden ser iguales o diferentes y en cada caso significan un átomo de nitrógeno

20

o un grupo $\begin{array}{c} -C= \\ | \\ R_9 \end{array}$, en donde R_9 representa hidrógeno, un grupo alcoholo inferior, que eventualmente está sustituido con un grupo $-O-R_8$, en donde R_8 tiene los significados indicados o un grupo $-CO-Z$, en donde Z tiene los significados indicados, así como sus sales farmacológicamente compatibles, caracterizado porque se hace reaccionar un compuesto de la fórmula II



en la que X , Y , R_1 y R_2 tienen los significados indicados, B representa un radical reactivo, A significa el grupo $\begin{array}{c} >CH_2 \\ >C=O \\ >CH-E \end{array}$ en donde E puede ser un grupo $-O-R_{10}$ o también juntamente con B puede ser un átomo de oxígeno y R_{10} representa hidrógeno o un grupo protector G , en donde en el caso de los indazoles susceptibles de tautomería el grupo protector G puede estar situado también junto al segundo átomo de nitrógeno X , con un compuesto de la fórmula III




en que R_4 y R_5 tienen los significados indicados, y en el caso en que A signifique el grupo $>C=O$ se reduce a continuación; y a continuación, en el caso de que R_8 represente un grupo alcenoilo o un grupo aroilo eventualmente sustituido, se esterifica el grupo hidroxilo que representa eventualmente a R_3 o en el caso en que R_8 represente hidrógeno, se hidroliza el grupo éster que representa eventualmente a R_3 así como se separa un grupo protector G eventualmente presente o en el caso en que uno o varios de los grupos R_1 , R_2 y R_9 representen un grupo hidroximetilo, éstos se preparan por hidrólisis a partir de un grupo alcocarbonilo por reducción o a partir de un grupo alcenoiloximetilo por hidrólisis, o se prepara un grupo metilo por reducción a partir de hidroximetil, aciloximetil o un grupo alcocarbonilo, y los compuestos obtenidos se transforman en caso deseado en sus sales farmacológicamente compatibles.

2.- "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE DERIVADOS DE AMINOPROPANOL".

Tal como se describe y reivindica en la presen-

te Memoria Descriptiva, que consta de cuarenta y tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 11 Noviembre 1977

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jard' with a stylized flourish at the end.